

DenaVin 3

Sublingvalni sprej
Dodatak prehrani

Vitamin D3 400 i.j.

Uljna suspenzija sa doznim dispenzerom.

DenaVin 3 400 i.j. sublingvalni sprej sadrži vitamin D3 (holekalciferol) i preporučuje se kao nadopuna vitamina D.

- Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji/iskorištavanju kalcija i fosfora
- Vitamin D učestvuje u održavanju normalnih nivoa kalcija u krvi
- Vitamin D doprinosi održavanju zdravlja kostiju i zuba
- Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije mišića
- Vitamin D pomaže normalno funkcionisanje imunološkog sistema
- Vitamin D učestvuje u diobi ćelija

SASTOJCI: holekalciferol (vitamin D3) i MCT ulje (trigliceridi srednje dužine lanca).

20 ml uljna suspenzija sadrži 400 doza.

Jedna doza sadrži 10 µg (400 i.j.) vitamina D3.

Sastojak	1 doza sadrži	RI*
Vitamin D3 (holekalciferol)	10 µg (400 i.j.)	100%

RI - Referentni unos*

NAČIN UPOTREBE:

Prije prve upotrebe DenaVin 3 sublingvalnog spreja, dozni dispenzer mora biti pripremljen. Priprema je jednostavna: držite proizvod u uspravnom položaju, pritisnite dozni dispenzer nekoliko puta dok suspenzija ne izađe iz dispenzera. Pritisnite još 2 puta do kraja. Proizvod je spreman za upotrebu. Provjerite da li je dozni dispenzer pritisnut do kraja i da ste uzeli punu dozu. Navedenu proceduru nije potrebno ponavljati tokom naredne primjene.

PREPORUČENA DNEVNA DOZA:

Dojenčad u toku prve godine života: 1 doza dnevno.

Djeca starija od jedne godine i adolescenti do 18 godina: 1-2 doze dnevno.

Odrasli: 1-2 doze dnevno.

DenaVin 3 sublingvalni sprej se može primijeniti direktno u usta, pod jezik, ili u kašičici sa malo tečnosti.

MJERE OPREZA/UPOZORENJA:

Ne uzimati istovremeno sa drugim proizvodima koji sadrže vitamin D. Ne prekoračivati preporučenu dnevnu dozu. Držati izvan dohvata djece. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda. Dodaci prehrani ne zamjenjuju uravnoteženu ishranu i zdrav način života i ne mogu se koristiti kao nadomjestak (zamjena) za raznovrsnu ishranu.

ROK TRAJANJA: 2 godine.

NAČIN ČUVANJA:

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi od 8°C do 25°C, u originalnom pakovanju, kako bi se sadržaj zaštitio od sunca.

NOSILAC ODOBRENJA:

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo
Igmanjska 38, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva:

05-37-1280-1/18-DP; 24.08.2018.